AD QVODLIBETARIAM.

QVÆSTIO MEDICA MATVTINIS DISPVTATIONIBVS AGITANDA in ſcholis Medicorum, die Iouis XIIII. Decembris M. RENATO CHARTIER, Medico & Profeſſore Regio moderatore

588

An Apoplexia phlebotomia?

CAVSA morbum, morbus ſymptoma præcedit origine. Cauſæ primùm, deinde morbi, poſtremò ſymptomatis, ſed contrariis ſuſcipienda curatio eſt. Omnis interna cauſa Cacochymia eſt, vel plethora. vtraque phlebotomiâ profligatur; neque repentinam morbi vehementiam, neque oborientem grauiſſimi ſymptomatis impetum, Catharſis, ſed vna phlebotomia quamprimùm ſedat.

MORBVS organicus obſtructio, quam parit vel cacochymia quadruplex, ſanguinea, bilioſa, pituitoſa, melancholica; vel plethora. Obſtructis cuiuſuis humoris affluxu vaſis hepatis, aut cordis ventriculis, aut cerebri meatibus, ſæuiſſimi omnium partium principum naſcuntur affectus, Hepatitis, Syncope, Apoplexia.

APOPLEXIA omnium ſymptomatum grauiſſimum διὰ παντελῆ στέρησιν τῆς ἐπιῤῥεούσης δυνάμεως generatur, ſpiritus ſcilicet animalis in neruos exitu, vel vitalis aditu è corde ad cerebrum prohibito, cum motus, ſenſus, cæterarúmq; functionum animalium deperditione. Capitis proram Carus, puppim, ſedem memoriæ, Lethargus, membranas Phrenitis, ventriculos Epilepſia, totum cerebrum Apoplexia obſidet, vt obſtructionis ſic Apoplexiæ cauſa pituita, ſanguis, & vtraq; bilis, imò nullus humor cauſa; ſed anguſtia ventriculorum cerebri, obſtructio ab humore craſſo, vel multo, compreſſio vel à tumore quadruplici, aut cranij depreſſione, & confidentiâ meatuum.

SANGVINIS copiâ, & anadrome vaſorum, ac præcipuè carotidum, & venarum iugularium ἀπόληψιν ſequitur ἀσθένεια, nunquam non acuta: cuiuſcumque humoris in cerebrum ἀπόσκηψιν ἰσχυρὴ ἀποπληξίη. huic febris acuta ſuperueniens, vtrique paralyſis, & hæmorrhoides remedio ſunt.

CVRABITVR apoplexia quamprimùm: nec ſeptuaginta horæ expectabuntur, quibus humorum perficiatur motus. Proderunt à parte affectâ vacuantia, reuellentia, deriuantia. Vacuant ἔῤῥινα, ſternutatoria, apophlegmatiſmi, fotus ſicci capiti deraſo admoti (apage ignitas ſartagines) & hirudines fronti ac temporibus affixæ. Reuellunt œnemata, ſuppoſitoria, pharmaca vt pilulæ, extremorum frictiones, venæ inferiores ſectæ. Deriuant cucurbitulæ ſcapulis, humeris, & ſub mento prope iugulares appoſitæ, venarum ſuperiorum apertio, & ab aliâ parte quàm ab eâ in quam paralyſis cadit.

Ergo apoplexia phlebotomia

Proponebat Lutetiæ IOANNES BERAVLT Pariſinus. Anno R. S. H. M. DC. XVII.

DOMINI DOCTORES DISPVTATVRI.

M. Ioannes Martin.	*M. Ægidius le Blanc.*	*M. Petrus Pijart.*
M. Michaël Seguin, P. Reg.	*M. Guillelmus de Vailly.*	*M. Simon Pietre.*
M. Petrus le Conte.	*M. Ioannes Maunoir*	*M. Ph. Harduinus de S. Iacques Decanus & M. R.*